

AVALUACIÓ PREANESTÈSICA DE VIA AÈRIA

NO DIFÍCIL

POTENCIALMENT DIFÍCIL

DIFÍCIL EVIDENT O CONEGUDA

HISTÒRIA CLÍNICA

Sense antecedents de VAD.
Sense patologia associada.

Críters de risc elevat:

- BMI > 40
- SAOS o roncadors diaris sever
- Patologia associada a VAD: massa tiroïdea, angina de Ludwig, acromegàlia

Críters addicionals:

- Edat > 50
- Sexe masculí
- Dents prominents
- Dispnea o disfàgia



Història prèvia de VAD,
si persisteixen els críters o els factors causants.

Presència de críters evidents de dificultat:
Deformitats o traumatismes cervicofacials
Patologia obstructiva o deformant de la via aèria


PRESENCIA D'ALGÚN D'AQUESTS CRÍTERS DE DIFICULTAT COMUNS A TOTES LES TÈCNiques DE MANEIG DE LA VIA AÈRIA

CLASSE MALLAMPATI

Es realitza amb el pacient assegut, el cap en posició neutra, boca oberta, llengua fora i en fonació "aaa".
Es valora segons la visualització de les estructures faringies (úvula, pilars i/o paladar tou).






PLASTICITAT REDUÏDA PER IRRADIACIÓ DEL COLL






SUBLUXACIÓ MANDIBULAR

Valora la capacitat de desplaçar la mandíbula per davant del maxil·lar superior. Es demana que avanci els incisius inferiors per davant dels superiors o que es mossegui el llavi superior.






DISTÀNCIA INTERDENTAL

Amb la boca oberta al màxim i lleugera extensió cefàlica, es mesura en la línia mitja la distància interincisiva (o la distància entre la vora d'oclusió de les genives, en el pacient edentat).





RANG DE MOVIMENT CAP I COLL

Amb el pacient assegut, de perfil i cap en posició neutra. Es demana al pacient que estengui al màxim el cap enrere. Es valora la posició del mentó respecte a la prominència occipital.



DISTÀNCIA TIRO-MENTONIANA

Distància que hi ha entre la prominència del cartílag tiroide i el mentó, amb la boca tancada i el cap en hiperextensió.



DIFÍCIL EVIDENT O CONEGUDA

PRESENCIA DE 3 O MÉS CRÍTERS DE RISC DE VENTILACIÓ O INTUBACIÓ A LA HISTÒRIA CLÍNICA O EXPLORACIÓ

LA PROBABILITAT DE DIFICULTAT AUGMENTA AMB EL NOMBRE DE CRÍTERS PRESENTS

ALTRES FACTORS QUE CAL CONSIDERAR INDIVIDUALMENT

Condicions del pacient:

- Risc broncoaspiració
- Poca tolerància a l'apnea
- Manca de col·laboració
- Grau d'urgència

Experiència de l'anestesiòleg:


- En les tècniques habituals
- En les tècniques de rescat

Factors de l'entorn:


- Material i ajuda disponible

PERÍMETRE DEL COLL

Amb el pacient assegut, i cap en posició neutra es mesura el perímetre amb una cinta mètrica.



VENTILACIÓ DIFÍCIL



IMC > 30

Barba

Edentació

Apnea de la son/roncadors