



Farmàcia d'Atenció Primària

Gladys Bendahan.
ICS Barcelona

David Lopez
Consorci Sanitari Maresme

18/11/2014

Farmàcies

CatSalut

Privada

Hospitals

Especialistes hospitals

Especialistes CAP II

Atenció Primària

FAP

Centres de Salut Mental

Residències geriàtriques



Objectiu

Augmentar la qualitat assistencial i garantir la sostenibilitat en relació amb l'ús dels medicaments





- Suport assistencial
 - Actualitza i transmet noves evidències
 - Realitza consultes terapèutiques
 - Gestiona alertes de seguretat
 - Genera eïnes de suport
- Suport de Gestió
 - Elabora quadern de comandament
 - Identifica línies de millora
 - Planifica intervencions
 - Les du a terme
 - Realitza el seguiment




Gestió del coneixement

Conjunt de processos en que participem



Amb qui treballem?



Sessions a l'equip

Reunions amb director i/o referent

Reunions de grup de farmàcia

Entrevistes amb els metges

(com hem evolucionat de 15min a 90min)






Plegats, la feina resulta més efectiva i gratificant !!!!


Eines de suport en que participem

Abordatge integral de la seguretat a l'eCAP



Prescripció Farmacològica Segura

PREFASEG valora on-time cada nova prescripció:



PREFASEG

Prefaseg genera alertes de seguretat per raons prèviament informades i codificades a la història clínica, i proporciona orientació terapèutica.



Interaccions



Contraindicacions



Fàrmacs desaconsellats a geriatria



Alergies



Duplicitats



Fàrmacos teratogènics

Funcionament



The screenshot displays the PREFASEG (Prescripció Farmacèutica Segura) software interface. At the top, the window title is 'pfsfg001: PREFASEG (Prescripció Farmacèutica Segura)'. Below this, there are fields for patient information: 'MARISA (DONA, 80 ANYS)' and 'SOBL'. A green box labeled 'Dades del pacient' highlights the patient name and age. Below the patient information, there is a medication entry: 'MANIDON 80MG 60 COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR [VERAPAMIL, CLORHIDRAT I ...]'. A pink box labeled 'Medicament' highlights this entry. A red circle highlights a small icon next to the medication name. Below the medication entry, the section is titled 'ALERTES PREFASEG'. Under this title, there is a section for 'CONTRAINDICACIÓ'. A blue box labeled 'Tipus d'alerta' highlights the word 'CONTRAINDICACIÓ'. The alert text reads: 'Desaconsellat per a pacients amb INSUFICIENCIA CARDIACA. Efecte produït: Agreujament d'una insuficiència cardíaca. Diltiazem i verapamil s'han d'evitar en pacients amb IC sistòlica i en FE < 50%. Orientació terapèutica: Es recomana tractar amb IECA (ARA II si hi ha intolerància) i beta-bloquejant a tots els pacients hipertensos amb ICC sempre que no existeixi contraindicacions i tolerin el seu ús. No associar en cap cas diltiazem o verapamil a beta-bloquejants'. A yellow box labeled 'Motiu de l'alerta' highlights the text 'Efecte produït: Agreujament d'una insuficiència cardíaca...'. A red box labeled 'Risc' highlights the text 'Desaconsellat per a pacients amb INSUFICIENCIA CARDIACA'. A green box labeled 'Recomanació' highlights the text 'Orientació terapèutica: Es recomana tractar amb IECA...'. At the bottom left, there are two alert levels: 'Alerta greu' (red exclamation mark) and 'Alerta moderada' (yellow exclamation mark). At the bottom, there are three buttons: 'Informació Prefaseg', 'Cancel·lar prescripció', and 'Continuar prescripció'.

Verificació en 2 passos: pacient, medicaments

Funcionament


pfsfg001: PREFASEG (Prescripció Farmacèutica Segura)

MARCELA APELLIDO1 APELLIDO2 (DONA, 80 ANYS) CIPDEMOGPC


 **DIABINESE 250MG 30 COMPRIMIDOS [CLORPROPAMIDA]** [Suport a l'usuari](#) 



ALERTES PREFASEG

FÀRMAC DESACONSELLAT

 Desaconsellat per a pacients majors de 75 anys
Efecte produït: Semivida d'eliminació prolongada, pot produir hipoglucèmia. Risc de produir el síndrome de la secreció inadequada d'hormona antidiurètica (SIADH)
Orientació terapèutica: Es recomana utilitzar altres sulfonilurees: Glimpirida, Glibenclamida o Gliclazida

CONTRAINDICACIÓ

 Desaconsellat per a pacients amb AL·LÈRGIA A SULFAMIDES
Efecte produït: Risc de reacció creuada amb altres medicaments estructuralment similars com les sulfamides
Orientació terapèutica: En cas de necessitar tractament farmacològic, metformina es considera el tractament de primera elecció i repaglinida de segona elecció.

 Alerta greu
 Alerta moderada

Informació Prefaseg **Cancelar prescripció** **Continuar prescripció**

Alerta Moderada

Alerta grave

Clasifica en funció de la gravetat i agrega les alertes que es donen a un mateix pacient

Funcionament

pfsfg001: PREFASEG (Prescripció Farmacèutica Segura)

MIQUEL PROVA PROVA (HOME, 64 ANYS) PRPR048010100

VOLTAREN 50MG 40 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES [DICLOFENAC SODIC] [Suport a l'usuari](#)

ALERTES PREFASEG

INTERACCIÓ POTENCIALMENT GREU

! IBUPROFENO BEXAL 600MG 40 COMPRIM RECUB PELIC EFG
Efecte produït: Augment d'efectes adversos gastrointestinals (ulcus pèptic, sagnat i/o perforació gastrointestinal)
Orientació terapèutica: Associació desaconsellada per un elevat risc d'hemorràgia gastrointestinal

TRACTAMENT REDUNDANT

! IBUPROFENO BEXAL 600MG 40 COMPRIM RECUB PELIC EFG [IBUPROFEN]
Efecte produït: Risc de toxicitat

! Alerta greu
! Alerta moderada

Informació Prefaseg **Cancel·lar prescripció** **Continuar prescripció**

La decisió final depen del professional

Self audit que accedeix el facultatiu

Self audit al que accedeix el facultatiu

siap_print - Recerca d'usuaris

Dades clíniques IT prOves Prescripció Agenda paciEnts vacUnes Catàlegs aLtres aJuda docuMentació Suport

Dades de l'usuari
Nhcsp: 12156
Adreça: PL GARRICO 11, 6-1
08016 - BARCELONA
Tel: 3116684

C UAE: CAP TURÓ EAP BA
Hcap inf? Si Assir inf? No
Servei de salut origen CatSalut? Si

Tipus de recerca
Visites dia: 23/05/2008
Agenda: AMIO

Ordenat: Hora Cognoms

Mot.no	Rea.	real.	H. Vis.	Nom	Cognem 1	Cognem 2	Sexe	CIP	T.Vis.	Edat
	<input type="checkbox"/>		09.00	VICENTE					00	78
	<input type="checkbox"/>		09.07	JUAN					00	24
	<input type="checkbox"/>		09.14	JUA					00	44
	<input type="checkbox"/>		09.21	JOS					00	63
	<input type="checkbox"/>		09.28	PAL					00	78
	<input type="checkbox"/>		09.35	ANT					00	42
	<input type="checkbox"/>		09.51	ANT					00	55
	<input type="checkbox"/>		09.58	JUA					00	62
	<input type="checkbox"/>		10.05	VIC					00	76
	<input type="checkbox"/>		10.12	MAR					00	62
	<input type="checkbox"/>		10.35	DOL					00	73
	<input checked="" type="checkbox"/>		10.42	BAR					00	66
	<input checked="" type="checkbox"/>		10.49	BAR					00	73
	<input type="checkbox"/>		11.26	SEGUN					00	67

Coment. visita:

Actual: 1 Total: 14

Recerca Nova Consulta Inserir Guardar

ACCÉS: per la prescripció

ECAP 10.0.0 - Connexió: CL CAN MASSUET EMILI BURDOY JOAQUIN P626UD30

sprf105y - Pla de medicació

NO 5/1 - cap ingr... - 4,8% reintr BEMA031123000

No s'ha preguntat al pacient per al·lèrgies conegudes / Reaccions adverses

Self Audit

Marcar Electrònica Totes Prefaseg

Medicament	Principi Actiu	Posologia	Durada	Envís x dies	Agència	Signat
ACIDO ACETILSALICILICO HERN PHARMA 100MG 30 COMPR GASTRORESIST EFG (B)	ACID ACETILSALICILIC	1 x 24 h.	Indefinida	1 30	RE-238	
ENALAPRIL CINFA 20MG 28 COMPRIMDOS EFG (MFC)	ENALAPRIL, MALEAT	1 x 24 h.	Indefinida	1 28	RE-238	
RANTIDINA CINFA 150MG 28 COMPRIM RECU EFG (MFC)	RANTIDINA	1 x 24 h.	Indefinida	1 28	RE-238	
SIMVASTATINA BEXAL 10MG 28 COMPRIMDOS RECUBIERTOS PELICULA EFG (MFC)	SIMVASTATINA	1 x 24 h.	Indefinida	1 28	RE-238	
TAMSULOSINA BEKAL 0,4MG 30 CAPSULAS DURAS LIBERACION MODIFICADA EFG (TAMSULOSINA, CLORHIDRAT	1 x 24 h.	Indefinida	1 30	RE-238	
ESPIFEN 600MG 40 SOBRES GRANULADO SOLUCION ORAL SABOR MENTA EFG (M	IBUPROFEN-ARGHINA	1 x 8 h.	200 dies	1 13	RE-73	
REVA 50MG 28 COMPRIMDOS RECUBIERTOS (PSQ) (CAS Metaró)	NALTREXONA, CLORHIDRAT	1 x 24 h.	120 dies	1 28	RE-118	

Prescripció Gestió SIRE Missatgeria

Més

Per aquí els pot anar a buscar

siap_print - Recerca d'usuaris

Dades clíniques | **IT prOves** | **Prescripció** | Agenda | paciEnts | vacUnes | Catàlegs | aLtres | aJuda | docuMentació | Suport

Activa
Històrica
tOtes
sElf audit
Signatura de prescripcions
Tract. tipus
Grups d'usuaris
gestió MAssiva
oRdre de Tractament
historial Earmacoterapèutic
Ed med. i p.sanit.
Productes per diabètics
canvi resPonsable prescripcions
traspàs prescripcions entre col·legiaTs
canvi codi producte
coNсульта canvi codi catàleg
consulta Interaccions principi actiu
consulta Interaccions Entre productes
reCepta electrònica
Llistats

Cognome

Sexe	CIP	T.Vis.	Edat

Per a tots els pacients
Del pacient

Actual: 0 Total: 0

Inserir Guardar

Tipus de recerca
 Visites del dia
Agenda [] [] []

Nom []
Cognome :
1er []
2on []
Sexe []
CIP []
HCAP []
UAB []

Recerca Nova Consulta


Dades de l'usuari
Nhcap:
Adreça:
Tel.:
UAB:
UAB INF:
C. UAB:
Hcap inf? Assir inf?
Servei de salut origen CatSalut?


☰  Seguretat

 Tractaments redundants

(el nombre de casos i accés directe)

 Contraindicacions Medicament - Problema de salut


 Alertes de seguretat

 Revisió de durades de tractament

 Polimediació

 Tractaments redundants 02/08 - 07/11

 Farmacs desaconsellats en geriatría

 Necessitat de gastroprotecció en geriatría

 Combinacions de risc elevat


 Medicació evitable

☰  Organitzatiu

 Excés de receptes segons pauta

☰  Eficiència

 Substitució per EFG o preu menor



 Substitució per equivalents terapèutics

Nostre acces a Self audit ens permet fer un seguiment

Consultes d'evolució Anular Revisions Sortir

Informes

- Seguretat
 - Tractaments redundants
 - Contraindicacions Medicament - Problema de salut
 - Alertes de seguretat
 - Revisió de durades de tractament
 - Polimediació
 - Tractaments redundants 02/08 - 07/11
 - Farmacis desaconsellats en geriatría
 - Necessitat de gastroprotecció en geriatría
 - Combinacions de risc elevat
 - Medicació evitable
- Organitzatiu
 - Excés de receptes segons pauta
- Eficiència
 - Substitució per EFG o preu menor
 - Substitució per equivalents terapèutics

Seguretat [Suport a usuari](#)  [Manual d'usuari](#) 

Configuració publicada Configuració de proves

Criteri _____ Agrupació _____

Tot l'ICS

Àmbit Àmbit

SAP SAP

UP Unitat productiva

Metge Metge

Pacient

Període _____

Des de Fins a Interval

Filtre per _____

Sense filtre

Relevància

Objectius

Self audit d'eficiència ens facilita el canvi a opcions més eficients

Consultes d'evolució Anular Revisions Sortir

Informes

- Seguretat
 - Tractaments redundants
 - Contraindicacions Medicament - Problema de salut
 - Alertes de seguretat
 - Revisió de durades de tractament
 - Polimediació
 - Tractaments redundants 02/08 - 07/11
 - Farmacs desaconsellats en geriatrica
 - Necessitat de gastroprotecció en geriatrica
 - Combinacions de risc elevat
 - Medicació evitable
- Organitzatiu
 - Excés de receptes segons pauta
- Eficiència
 - Substitució per EFG o preu menor
 - Substitució per equivalents terapèutics**

Substitució per equivalents terapèutics [Suport a usuari](#) [Manual d'usuari](#)

Configuració publicada Configuració de proves

Criteri _____ Agrupació _____

Tot l'ICS

Àmbit _____ Àmbit

SAP _____ SAP

UP _____ Unitat productiva

Metge _____ Metge

Pacient

Període _____

Des de 30-03-2013 Fins a 15-11-2014 Interval Acumulat

Filtre per _____

Sense filtre

Relevància

Grups terapèutics

- Antagonistas de angiotensina II, monofarmacos
- Antagonistas de angiotensina II y diureticos
- Bifosfonatos
- ESTATINES
- Inhibidores de la bomba de protones
- Inhibidores selectivos de la recaptacion de serotonina
- Otros antiepilepticos

Sortir

Alertes SIRE

Filtre optatiu	error SIRE
Preu menor	El producte prescrit no està a preu menor
Nombre màxim d'envasos per interval	El nombre d'envasos podria ser elevat. Revisar el nombre de receptes i l'interval de recollida
Dosi màxima	Es supera dosi màxima o dosi alta diària segons fitxa tècnica, d'acord amb l'interval de receptes definit. Revisar el nombre de receptes i interval de recollida
Genèric (producte amb DDD)	La dosi diària prescrita és 3 o més cops superior a la definida (DDD), d'acord amb l'interval de recollida. Revisar nombre de receptes i interval de recollida
Genèric (producte sense DDD)	S'ha detectat que cada recepta cobreix menys de 8 dies de tractament i es supera un d'aquests dos criteris: Cost total del tractament supera els 1000€ o el nombre de receptes és superior a 27. Revisar nombre de receptes i interval de recollida

INFORFARMA patients

Nombre CIP consumidors (Mensual)	% Pacients consumidors d' IBP (Mensual)	% Pacients consumidors d' AINES (Mensual)	% Pacients consumidors de Benzodiazepines (Mensual)	% Pacients consumidors fàrmacs Osteoporosi (Mensual)	Pacients amb 10 o més principis actius diferents (ATC) (Mensual)	Pacients amb mínim 10 bolquers/dia (Mensual)
----------------------------------	---	---	---	--	--	--

Pacients amb 3 o més antipsicòtics diferents (ATC) (Mensual)	Pacients amb 3 o més benzodiazepines diferents (ATC) (Mensual)	Pacients amb 3 o més antidepressius diferents (ATC) (Mensual)	Pacients amb 3 o més AINE diferents (ATC) (Mensual)	% Pacients \geq 75a amb medicació inadequada 2014 (Mensual)	% Pacients amb Fluoxetina o Sertralina o Fluvoxamina < 18 anys / Pacients < 18 anys amb Antidepressius (ATC) (Acumulat)	% Pacients amb Clozapina / Pacients amb Antipsicòtics sense Liti (ATC) (Acumulat)
--	--	---	---	---	---	---

Elaborem informes de suport per millorar la seguretat clínica



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Planificació i Recursos Sanitaris
Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

NOTA INFORMATIVA
Tipus de producte: **Medicament d'ús humà**

CALCITONINA: us restringit a tractaments de curta durada

Informativa adreçada a professionals sanitaris que ha emès l'Agència Espanyola de Medicaments (AEMPS) sobre la restricció de l'ús de la CALCITONINA a tractaments de curta durada per a pacients amb osteoporosi i risc de fractura vertebral.

Institut Català de la Salut **CANM**
Comitè d'Avaluació de Nous Medicaments

ROFLUMILAST en el tractament de l'MPOC greu

NO SUPOSA UN AVENÇ TERAPEÛTIC

Tractament estàndard: Corticoides inhalats, Teofil·lina

NO hi ha dades comparatives amb altres medicaments. La seguretat a llarg termini es desconeguda. S'han descrit efectes adversos importants.

Justificació

El tractament farmacològic de l'MPOC ha de ser progressiu, s'ha d'adequar a la gravetat de l'obstrucció i dels símptomes, així com a la resposta del pacient. Els broncodilatadors inhalats (els agonistes beta-2 adrenèrgics i els anticolinèrgics) són la base del tractament simptomàtic en pacients amb MPOC. En els pacients amb MPOC greu i exacerbacions freqüents es pot associar un corticoides inhalat al broncodilatador d'acció prolongada.

Lloc en la terapèutica

A partir dels estudis amb roflumilast s'ha proposat un nou fenotip clínic que englobaria els pacients amb MPOC i símptomes de bronquitis crònica. L'MPOC és una malaltia complexa i heterogènia i és possible que existint diferents fenotips clínic amb pronòstics i abordatges terapèutics diferents. Aquests fenotips, actualment en estudi, han de ser validats longitudinalment respecte dels resultats clínics rellevants (outcomes). No hi ha cap assaig clínic en què el roflumilast es compara amb cap altre farmac actiu en aquest subgrup de pacients (MPOC greu-moderada amb símptomes de bronquitis crònica).

informe que, després d'una revisió europea del béns beneficiària, el comitè d'opinions de Medicaments (CHMP) recomana que els medicaments que contenen calcitonina s'interdiguin per a l'ús de curta durada per fer que noves dades indiquen que, després de l'ús de curta durada, el risc de fractura vertebral augmenta. Així mateix, el tractament amb calcitonina injectable s'ha de limitar a períodes curts de tractament en malaltia de l'os, prevenció de pèrdua de massa òssia deguda a immobilització sobrada i hipercalcèmia causada per càncer.

Us enviem aquesta informació per tal que en tingueu coneixement i en pugueu fer la difusió escassa i selectiva que considereu oportuna als professionals sanitaris implicats en la prescripció d'aquests medicaments i als pacients.

Es pot accedir a la nota informativa de l'AEMPS a través de Canal Medicaments (<http://medicaments.gencat.cat>), apartat: medicaments/professionals/seguretat/informatives/medicaments/professionals/seguretat.

Salvador Casanys Pou
Cap de servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris


TeraplCS Butlletí de la Comissió Farmacoterapèutica

edicions anteriors

Comissió Farmacoterapèutica

Gestió

A Catalunya l'any 2013 desde Primària es va facturar **1.315.134.931€**



Pròpies ICS
Contracte Catsalut

Estructura provisional Acord gestió EAP 2014 (Grupal)

CONCEPTE	OBJECTIU	2013	2014
Contracte programa	Indicadors part variable contracte programa	5%	10% 1,9
Sostenibilitat	Balanç econòmic	15%	15%
	Compliment DMA	10%	10%
Resultats activitat i qualitat assistencial	Estàndard Qualitat Assistencial de l'EAP (EQA)	25%	27,5%
	Estàndard Qualitat Prescripció Farmacèutica de l'EAP (EQPF)	15%	12,5%
	Seguretat ús del medicament	10%	10%
	Millora resolució AP	2,5%	2,5%
	Estàndard Qualitat Diagnòstica de l'EAP (EQD)	7,5%	5%
	Atenció a la cronicitat		
Gestió Qualitat	Pla Qualitat i Seguretat del pacient		

+ 15% individual

David???

Què es fa per gestionar?

- Identifica línies de mejora
- Planifica intervencions
- Les du a terme
- Realitza el seguiment

EQPF de l'ICS

Data Inicial: 01/01/2012 Data Final: 06/2012 Pobl. Total: 530.768 Pobl. >65 anys: 83.808 Pobl. ped.: 85.552 Data Llistat: 11/10/2012

ESTANDAR DE QUALITAT - 2012				
Erf: 9308: 5.161.806 BINIM SAP Barcelonès Nord i Maresme				
Nivell de detall Grup d'UPS Agregada				
Puntuació Total: 83				
	MITJANA GRUP ICS	VALORS CALCULATS	OBJECTIU	PUNTUACIÓ
INDICADORS GLOBAIS				
Utilització de fàrmaca d'eficàcia provada	93,50%	93,46%	>=92%+5	5
Utilització d'especialitats farmacèutiques genèriques	43,40%	44,18%	>=30%+5	5
Seguiment recomanacions del CANM (Ansal)	0,006%	0,003%	VALORABLE A FINAL D'ANY	0
Seguiment recomanacions del CANM	1,38%	1,24%	<=1,3%+5 <=1,1%+10 <=0,9%+15	5
INDICADORS ESPECÍFICS				
Utilització d'antihipertensius (AHT)				
% DIU SOLS O ASSOCIATS A RECOMANATS / AHT	27,36%	29,02%	>=24%+1 >=30%+3	1
% ARAII / IE			>=4 <=43%+2	4
% FARMACS			>=4 >=68%+5	4
Utilització d'antidiabètics				
DHD=ULC			>=6 <=117+4	0
% FARMACS			>=2 >=90%+4	4
Utilització d'antidolorífics				
DHD=AINE			>=6 <=41+4	4
% FARMACS			>=2 >=82%+4	4
Utilització d'antipsicòtics				
DHD=AB *			>=6 <=11+4	0
Utilització d'antidèpressius				
% PENICIL·L			>=60%+1	1
% AMOXICIL·L			>=50%+1	1
% FARMACS			>=1 >=75%+2	1
Utilització d'antidèpressius				
% FARMACS			>=7 >=71%+15	15
Utilització d'ansiolítics				
% ASSOCIATS			>=4 <=30%+2	2
% FARMACS			>=4 >=72%+6	4
Utilització d'antidèpressius				
% FARMACS			>=2 >=64%+10	10
Utilització d'ansiolítics hipnòtics (ANSH)				
DHD=ANSH	74,75	72,49	<=63+5 <=76+4	4
% FARMACS RECOMANATS/ANSH	87,18%	86,25%	>=85%+2 >=87%+4	2
Utilització d'antidiabètics orals (DIABO)				
% FARMACS RECOMANATS/DIABO	61,47%	62,19%	>=79%+4 >=82%+7 >=85%+10	7

✓ Antihipertensius

✓ Antiulcerosos

✓ Antibiòtics

✓ Patologia musculoesquelètica

✓ Osteoporosis

✓ Hipolipemians

✓ Respiratori


✓ Antidepressius

✓ Ansiolítics

✓ Antidiabètics

IQF de Catalunya

Puntuació IQF 2014



(*) Si la DHD65 d'antibiòtics és <=8 s'obté directament el total de punts d'antibiòtics.

Població ICS: Pobl. Total: 5.705.609 Pobl. >65 anys: 966.914 Pobl. ped.: 887.304

Tenim un aplicatiu per identificar pacients amb determinades situacions

Seleccioni per una nova execució:

Consultes existents
<input type="radio"/> Agomelatina
<input type="radio"/> Agomelatina >74anys
<input type="radio"/> AINES
<input type="radio"/> Alendronat sol
<input type="radio"/> ALENDRONIC+VIT D
<input type="radio"/> Alertes:Domperidona Ranelat Sronci
<input type="radio"/> Aliskiren
<input type="radio"/> Ansiolitics

1 2 3 4 5 6 7 8

ICS	Tot IICS
AMBIT	
SAP	
Grup UP	
UP	

Nivell d'extracció: Número de registres Resum de dades Detall de dades


Executar

Molt útil per alertes, i intervencions!!!!

Llegeix directament a l'HCAP

Es pot filtrar per edat, sexe i patologia

Larga trajectòria-Evolució de l'Índex sintètic de l'EQPF al global d'equips d'atenció Primària



Promig de la puntuació obtinguda pel global dels Equips d'atenció primària

*A les dades del 2014 falta valorar l'indicador de seguiment de les recomanacions del PHF-APC anual que té un pes de 5 punts. Al mateix període de l'any anterior la puntuació del global d'EAP era de 85 punts

Quina és la nostra carta als reis?



Avançar amb la coordinació amb especialitzada

Encare hi ha molt camí per endavant

Coordi*n*ació






Hospitals
Centres de Salut Mental
Residències geriàtriques
Privades

- ✓ Comissions
- ✓ COF (Catsalut)
- ✓ Grups Clínics
- ✓ Alguns Serveis de Farmàcia




Procés coordinació altres nivells assistencials



i altres Entitats Proveïdores



Guia de recomanacions terapèutiques per l'abordatge dels Síntomes Psicològics i Conductuals relacionats amb la Demència (SPCD)



INFORFARMA residències geriatriques


% Env. MATMA / Total Env. Especialitats (fixe) (NOVETATS)	% Env. MATMA / Total Env. Especialitats (dinàmica) (NOVETATS)	% IECAs / Total IECAs + ARA II (DDD)	% AHT recomanats / Total AHT (menys furosemida i esplerenona) (DDD)	% IBP recomanats / Total IBP (DDD)	% Alendronat (+ Alendr.+Vit D) / Total fàrmacs osteoporosi (DDD)	% Hipolipemians recomanats / Total Hipolipemians (DDD)	% Citalopram, Sertralina / Total Antidepressius (menys Trazodona) (DDD)
---	---	--------------------------------------	---	------------------------------------	--	--	---

% Antidiabètics no insulítics recomanats / Total Antidiabètics no insulítics (DDD)	% Risperidona / Total Antipsicòtics atípics (DDD)	% Risperidona Consta + Paliperidona Depot / Total Risperidona + Paliperidona (envasos)	% Penicil·lines, Eritomicina, Claritromicina, Pipemídic, Norfloxacina, Fosfomicina, Ciprofloxacino / Total Antibiòtics (DDD)	% Ibuprofè, Naproxè / Total AINEs (DDD)	% Pacients >= 75a amb BZD recomanats (lorazepam, lormetazepam) / Total Pacients >= 75a amb BZD ATC (Periode)	% Pacients >= 75a amb medicació inadequada (Periode)	% CIP consumidors Bifosfonats sobre Total consumidors (periode)
--	---	--	--	---	--	--	---

Núm. places	Nombre CIP consumidors (Periode)	Import líquid dispensat	cost/usuari	Increment any anterior	Nombre envasos	Increment any anterior envasos	Import líquid / envasos	% RE (acumulat)	% RE (mensual)
-------------	----------------------------------	-------------------------	-------------	------------------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	-----------------	----------------

Nombre CIP consumidors amb bolquers	Import líquid AIU	Increment import AIU	Envasos AIU	Increment envasos AIU	% Import líquid AIU s/Total Import líquid	% Env AIU dia s/Env AIU Total	% Env AIU SN s/Env AIU Total	Nombre AIU per CIP i dia	Pacients amb mínim 10 bolquers/dia (Mensual)	% Líquid Efectes i Accessoris sense AIU s/Total líquid
-------------------------------------	-------------------	----------------------	-------------	-----------------------	---	-------------------------------	------------------------------	--------------------------	--	--

Puntuació IQF 2014



Objectiu comú Primària-hospitals, CSM

Però

pes molt diferent

què passa a l'hospital?



Llistes tancades per a ús intern

Però.....

Necessitem anar a una!!!!



Consultes Externes
RAE
Urgències

Projecte pilot a Mataró



Listes tancades per a ús intern



Consultes Externes
RAE
Urgències

